



## РУМИНПРО

Для всех категорий КРС

### *Дрожжевой пробиотик для оптимизации рубцового пищеварения жвачных*

#### **Описание:**

РуминПро – специально подобранный штамм живых дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* RP-1705. Это эффективный способ корректировать недостатки кормления высокоудойных коров и коров со средней продуктивностью, особенно, в стрессовых ситуациях. Например, таких, как переход с одной силосной ямы на другую или при тепловом стрессе. Действие дрожжевого пробиотика РуминПро: повышает перевариваемость клетчатки, стабилизирует уровень Ph в рубце.

#### **Преимущества РуминПро для:**

##### **Молочных коров:**

- до 1 кг/сутки: увеличивается потребление сухого вещества рациона;
- до 2 л/сутки: повышается надой молока за период раздоя. До 1 литра/сутки повышается за всю лактацию;
- на 0,1-0,2%: повышается содержание жира и белка в молоке;
- на 5-10%: увеличение эффективности использования кормов.

##### **Общие преимущества:**

- улучшение здоровья при длительном применении;
- сокращение потери живого веса коровами после отела;
- снижение ветеринарных затрат.

##### **Молодняка:**

- на 7-15%: повышение среднесуточных привесов (после отъема и до отъема).

##### **Общие преимущества:**

- стимуляция заселения преджелудков полезной микрофлорой и развития слизистой рубца;
- повышение потребления и усвоения корма;
- укрепление естественного иммунитета.

##### **Скота на откорме:**

- на 5-10%: увеличение эффективности использования кормов;
- на 10-15%: повышение среднесуточных привесов.

##### **Общие преимущества:**

- снижение риска развития ацидоза, сокращение вынужденной выбраковки (ламиниты, заболевание печени, вздутие рубца).

#### **Сырьевой состав:**

Живые дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* RP-1705, 1x10, КОЕ/г<sup>9</sup> и доломитовая мука.

#### **Инструкция по применению:**

Наиболее эффективным периодом для скармливания являются 2-3 недели до отела и до 4 месяцев после отела. Однако, биопрепарат можно давать животным в течение всего межотельного периода при наличии в рационе значительного количества концентратов, низкой питательности или при большой доле объемистых кормов. Препарат особенно эффективен при стрессовых ситуациях или смене рациона.

- 1-2 кг/т: норма ввода в комбикорма, в зависимости от типа комбикорма;
- 10-20 г на голову: суточная дача для коров;
- 2-5 г/100 кг: живой массы для скота на откорме;
- 5-10 г/гол./сутки: молодняк крупного рогатого скота старше года и нетели;
- 2-5 г/гол./сутки: молодняк крупного рогатого скота до года.

**Форма выпуска\Фасовка:** ведро 25 кг.

**Условия хранения:** хранить в сухом прохладном месте.

**Продолжительность хранения:** гарантированная активность дрожжей до 9 месяцев от даты производства при соблюдении условий хранения.